

Skrubben

Vadehavet er opvækstområde for skrubbeyngel, så om sommeren kan man fange de små skrubber med rejehov i det lave vand.

UDSEENDE

Skrubben er rødbrun på oversiden og kan have enkelte rødgyldne pletter ligesom rødspætten. Små skrubber og rødspætter er svære at skelne fra hinanden, da de begge er glatte på oversiden. Når skrubben vokser udvikler den imidlertid hurtigt en række piggede og skarpe benknuder på oversiden, især langs sidelinjen. Den vil derfor føles ru, mens rødspættens overside forbliver helt glat. Større individer af skrubbe og rødspætte er derfor som regel nemme at skelne fra hinanden, men der forekommer krydsninger mellem de to arter, såkaldte leps, som indimellem kan skabe lidt forvirring.

ALDER

Skrubber bliver sjældent mere end 7-8 år gamle og højst 15 år.

ÆG/UNGER

Hunnen gyder op til 2 millioner æg, som klækkes efter en uge. I starten er larven 3 mm lang og lever pelagisk, dvs. fritsvømmende i vandsøjlen. Når larven er 1 cm lang, begynder det ene øje at vandre over mod den anden side af hovedet, og larverne begynder at svømme på siden og søger ned mod bunden. Når larven er 12-14 mm, er øjet nået helt over på den anden side af hovedet. Undersiden bliver hvid og oversiden bliver mørk.

Fladfisk er enten højre- eller venstrevendt, alt efter hvilken side der vender opad. For skrubberne gælder, at 66 % af individerne er højrevendte, mens resten er venstrevendte.

FØDE

Skrubben lever af børsteorme, slikkrebs, tanglopper, hesterejer og muslinger.

LEVESTED

Skrubben kan trives både i ferskvand, brakvand og saltvand, men vandet skal have en saltholdighed på mindst 10 promille, for at den kan yngle.

FJENDER

Skrubbens spæde yngel har mange fjender og ædes af alt lige fra hesterejer og strandkrabber til fisk som f.eks. kutlinger. Større skrubber bliver ædt af sæler, marsvin og fugle i Vadehavet.



Ekstra information

Skrubben har fået sit navn fra de ru benknuder langs sidelinjen. Når man flår dem, kan man nemt "skrubbe" skindet af hånden.

Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet