

STRAND-MALURT

Strand-malurt vokser i marsken langs Vadehavet. Planten vokser gerne på saltholdig og næringsrig bund som på tangbælter med opskyl.

KENDETEGN

Strand-malurt er let at kende på de grå- og hvidfiltrede stængler og blade. Planten er buskagtig og 10-40 cm høj. Stænglen forneden er træagtig. Bladene er to-tre gange fjersnitdelte, og har 1 mm smalle linieformede bladflige. Strand-malurt tilhører kurvblomstfamilien.

LEVEVIS

Strand-malurt er en flerårig plante. Strand-malurt blomstrer i august-september og de små kurve har grønlig-rødgule blomster. Blomsterne bestøves ved hjælp af vinden. Frøene spredes ved hjælp af vind og vand. Strand-malurt formerer sig desuden ved at sætte nye skud fra underjordiske vandrette rodstængler.

MALURT MOD MØL

Tidligere var meget af folkets tøj vævet af uld. Det gav store problemer med møl, fordi deres larver lever af uld og derved gnaver huller i tøjet. Problemet kunne afhjælpes ved at tørre malurt og placere det i skabe og skuffer, hvor tøjet var gemt.

PLANTEMEDICIN

Strand-malurt indeholder forskellige aromatiske og bitre stoffer. Planten er giftig pga. stoffet thujon. Tidligere blev stærk duftende planter ofte anvendt i medicin. Den medicinkyndige Henrik Harpestreng skrev allerede i middelalderen om strand-malurt. Gennem århundreder er strand-malurt blevet brugt mod mavelidelser. I den sammenhæng er planten også blevet anvendt som ormemiddel.

Prøv at knuse et blad mellem to fingre og lugt til planten.



Vidste du, at...

Malurt kan smage ret bittert og heraf kommer udtrykket "At komme malurt i bægeret"? Det er et udtryk, som vi bruger om noget, der ikke er særlig behageligt.

