

STRANDSKADEN

Ved lavvande spreder strandskaderne sig ud over vadefladerne for at finde mad. Når højvandet kommer, samles de efterhånden i tætte store flokke og hviler.

UDSEENDE

Strandskaden er en kraftig vadefugl på størrelse med en allike. Den har sort overside og hvid underside. Det lange lige næb er orangerødt og markant rødt hos de voksne fugle om sommeren. De unge fugle har en mørk næbspids, som det ses på fotoet.

Når den flyver, ser man et tydeligt hvidt bånd langs den sorte vinge.

ALDER

Ringmærkning viser, at strandskaden kan blive op til 30 år.

ÆG/UNGER

Strandskaden yngler på flade strande, søbredder og på strandenge, men kan også slå sig ned på flade tage på husene i byerne. Strandskaden lægger 2-3 æg i en lille fordybning i jorden foret med lidt planter og muslingeskaller. Når ungerne er klækket bliver de fodret til de er flyvefærdige.

FØDE

Strandskaden æder hovedsagelig muslinger, som den åbner med sit kraftige næb, men orme og snegle indgår også i menuen.

LEVESTED

Strandskaden er udbredt over hele Europa, Sibirien og Vadehavet.

FJENDER

Især ungerne er udsat for rovdyr og store måger. Den største fjende for de gamle fugle er vandrefalken og dernæst mennesket, som forstyrrer eller ødelægger deres levesteder.



Ekstra information

En strandskade kan dagligt æde omkring 300 muslinger. I det danske Vadehav kan der være op til 60.000 strandskader på samme tid. Det vil sige, at de hver dag tilsammen kan æde op til 18.000.000 muslinger.

